

PRISTOPNA IZJAVA ZA GORIŠKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU

Spodaj podpisan/a prostovoljno izjavljam, da želim postati član Goriškega društva za boj proti raku in za potrebe evidence posredujem podatke:

Ime: _____

Priimek: _____

Datum rojstva: _____

Naslov: _____

Telefon: _____

Elektronski naslov: _____

Goriško društvo za boj proti raku se obvezuje, da osebnih podatkov članov ne posreduje nepooblaščenim osebam ali pravnim subjektom.

S podpisom se zavežujem, da bom deloval/a v skladu s statutom društva, sprejel/a društvena pravila in se po njih ravnal/a.

Članstvo je prostovoljno in brez članarine.


Kraj in datum: _____

Podpis: _____

Pristopno izjavo pošljite na naslov:
GDBPR, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica

KORISTNI NASLOVI

- GORIŠKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU,
05 33 08 600, goriskaprotiraku@gmail.com
- Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica, 05 33 01 000
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Nova Gorica,
05 330 86 00
- Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica,
05 33 83 200



Slika prikazuje virus HPV. Opisanih je več kot 200 različnih genotipov HPV, 45 je takšnih, ki povzročajo okužbe rodil in spolovil.

Hočeš Preprečiti Virusno okužbo?



Zgibanko izdalo Goriško društvo za boj proti raku,
december 2013.



GORIŠKO DRUŠTVO BPR

GDBPR je humanitarno in
prostovoljno društvo.
Kontakt:
goriskaprotiraku@gmail.com
www.goriskaprotiraku.si

ALI STE VEDELI, DA ...


Humani virusi papiloma (HPV) so velika družina virusov, ki lahko pri človeku povzročijo različne spremembe. Ime so dobili po tem, da povzročajo nenevarne a neprijetne bradavice, ki jih z izrazom iz latinščine imenujemo papilomi.

Manjša skupina hudo ogrožajočih HPV pa lahko okuži celice materničnega vratu. Če teh sprememb ne pozdravimo, lahko iz njih nastane rak materničnega vratu.

OKUŽBA IN PRENOS

Okužimo se lahko vsi. Okužba s HPV se prenaša pri intimnih telesnih kontaktih. Okužba je pogostejša pri mladostnikih in mlajših odraslih. **HPV se najhitreje prenaša s spolnimi odnosi.**

Okužba poteka prikrito (ne povzroča simptomov). Tako moški kot ženska sta prenašalca virusa HPV.



OKUŽBO S HPV LAHKO PREPREČIMO

- Odložitev prvega spolnega odnosa v obdobje večje zrelosti
- Zvestoba enemu partnerju oziroma čim manjše število spolnih partnerjev
- Uporaba kondoma (nepopolna zaščita)
- Cepljenje proti HPV

POSLEDICE OKUŽBE S HPV

Večina okužb mine brez posledic. Včasih pa se razvije dolgotrajna okužba, ki lahko vodi v predrakave spremembe ali raka materničnega vratu, nožnice, zunanjega spolovila pri ženskah, penisa pri moških in anusa pri obeh spolih. Druge s HPV povezane bolezni so še genitalne bradavice in papilomi grla.

RAK MATERNIČNEGA VRATU (RMV)

Je bolezen, pri kateri se normalne celice materničnega vratu spremenijo v rakave. Spremembe v celicah potekajo postopoma, kar lahko traja 10 do 15 let. Skoraj vsi primeri RMV (več kot 99%) so povezani z okužbo z visokorizičnimi genotipi HPV. Z rednimi ginekološkimi pregledi in odvzemi brisov odkrijemo vsake spremembe v celicah in z uspešnim zdravljenjem preprečimo raka.

KOMU JE CEPLJENJE NAMENJENO?

Namenjeno je ženskam od 9. leta naprej. **Najbolj učinkovito je cepljenje deklic v otroški dobi, med 10. in 13. letom starosti, pred prvim spolnim odnosom,** ki zelo verjetno še niso bila izpostavljena virusom HPV.

Cepljenje je priporočljivo tudi za ženske, ki so že imele spolne stike, saj morda še niso bile izpostavljene virusom HPV.

Priporočljivo je tudi za ženske s potrjeno okužbo s HPV, ker jih lahko zaščiti pred drugimi genotipi virusov.

KAJ PA CEPLJENJE DEČKOV?

Glede na izsledke raziskav in priporočila ponekod po svetu je cepljenje priporočljivo tudi za dečke. **Okužba s HPV pri dečkih povzroča predrakave spremembe in raka penisa, zadnjika, grla in genitalne bradavice.**

ALI JE CEPIVO VARNO?

Cepivo je varno, kar kažejo izsledki raziskav, opredeljeni na osnovi več kot osemletnega opazovanja in nenehnega spremljanja morebitnih neželenih učinkov pri več kot 50 mio cepljenih osebah. Tudi v Sloveniji nismo zabeležili resnih neželenih učinkov.

KONTRAINDIKACIJE CEPLJENJA

V primeru, da je oseba v preteklosti imela nevarno alergijsko reakcijo na kvasovke ali na katerokoli od sestavin, ki jih vsebuje cepivo proti HPV.

V primeru, da je oseba že imela reakcijo na prejšnji odmerek cepiva proti HPV.

V primeru nosečnosti.

V primeru hujše akutne bolezni, močno zvišani telesni temperaturi.

NEŽELENI UČINKI CEPLJENJA

Učinki cepljenja so blagi in prehodni. Najpogostejši pojav je rdečina in oteklina na vbodnem mestu.

Vendar cepiva (tako kot vsa zdravila) včasih povzročajo resne težave, npr. hude alergijske reakcije, tveganje, da bi katerokoli cepivo resno škodovalo ali povzročilo smrt, pa je izredno majhno.

KJE DOBITI INFO O CEPLJENJU

- Šolski zdravnik/zdravnica
- Osebni zdravnik/zdravnica
- Ginekolog/ginekologinja
- Spletna stran Nacionalnega Inštituta za javno zdravje (NIJZ)
- NIJZ, OE Nova Gorica, Vipavska c.13, 5000 Nova Gorica